



Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig, weil sie Ihnen helfen wird, **HYLO®-DUAL** richtig anzuwenden.

HYLO®-DUAL

Natriumhyaluronat und Ectoin

Befeuchtet trockene Augen, stabilisiert den Tränenfilm und reduziert damit entzündliche und allergische Symptome wie Juckreiz und Brennen
Sterile, phosphatfreie Lösung ohne Konservierungsmittel

Was ist HYLO®-DUAL?

HYLO®-DUAL ist eine sterile, konservierungsmittelfreie Lösung mit 0,5 mg/ml Natriumhyaluronat, 20 mg/ml Ectoin, Boratpuffer und Wasser.

Wozu braucht man HYLO®-DUAL?

HYLO®-DUAL befeuchtet die Hornhaut und Bindehaut und schützt vor übermässiger Verdunstung der Tränen. Diese Stabilisierung des Tränenfilms lindert Augenreizungen, die mit entzündlichen Symptomen verbunden sind, oder die durch Allergien hervorgerufen sind. Das brennende und juckende Gefühl der Augen verschwindet.

Wann sollte man HYLO®-DUAL anwenden?

Brennende, juckende und tränende Augen, das Gefühl Sand in den Augen oder trockene Augen zu haben, sind Symptome eines gereizten Auges. Häufig sind dies Zeichen dafür, dass das Auge nicht ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt ist. Eine andere Ursache können aber auch Überempfindlichkeiten gegenüber bestimmten Stoffen (z.B. Pollen, Tierhaare oder Hausstaub), sogenannte Allergien sein. Da eine Allergie mit den gleichen Beschwerden einhergeht, ist die Unterscheidung zwischen trockenen und allergisch bedingten gereizten Augen schwierig. In diesen Fällen bietet **HYLO®-DUAL** durch das duale Wirkprinzip aus Natriumhyaluronat und Ectoin besondere Vorteile. Natriumhyaluronat ist eine natürliche Substanz, die im Auge, aber auch in anderen Körperteilen zu finden ist. Sie hat die besondere physikalische Eigenschaft, einen gleichmässigen, stabilen und besonders lang haftenden Feuchtigkeitsfilm auf der Oberfläche des Auges zu bilden, ohne rasch abgespült zu werden. Ectoin ist ein natürlicher Stoff, der aus Mikroorganismen gewonnen wird, die in extremen Umgebungen (z.B. Salzseen) leben. Um sich vor den dort herrschenden extremen Umweltfaktoren zu schützen, bilden diese Mikroorganismen den Naturstoff Ectoin, dessen spezielle Eigenschaften in **HYLO®-DUAL** genutzt werden. Ectoin erhöht die Wasserbindung an den Zellen der Augenoberfläche und bildet damit eine physiologische Barriere auf der Bindehaut für allergen wirkende Stoffe. Gleichzeitig stabilisiert Ectoin den fettlöslichen Anteil des Tränenfilms, der vor einer übermässigen Verdunstung der Tränenflüssigkeit schützt. Im Zusammenwirken von Natriumhyaluronat und Ectoin wird das Auge mit einem intensiven, lang haftenden Feuchtigkeitsfilm versorgt und vor der Verdunstung der Tränen geschützt. Damit werden umgebungsbedingte Reizungen, die zu entzündlichen Symptomen führen, genauso gelindert wie die typischen Symptome Juckreiz und Brennen, die bei allergischen Reaktionen auftreten.

Wie wendet man HYLO®-DUAL an?

Verwenden Sie **HYLO®-DUAL** nur, wenn die Versiegelung der Faltschachtel vor der ersten Anwendung unversehrt war.




Bild 1:

Vor jedem Gebrauch die Kappe abnehmen. Halten Sie dazu die Kappe knapp über der Flasche fest und ziehen Sie mit Ihrer anderen Hand die Flasche mit einer Drehbewegung von der Kappe weg. Bitte vor der ersten Anwendung von **HYLO®-DUAL** die Flasche mit der Tropferspitze senkrecht nach unten halten und so oft auf den Flaschenboden drücken, bis der erste Tropfen an der Flaschenspitze austritt. Danach ist die Flasche für die folgenden Anwendungen gebrauchsfertig.




Bild 2:

Halten Sie die Flasche mit der Tropferspitze nach unten, indem Sie den Daumen auf die Flaschenschulter und die anderen Finger auf den Flaschenboden legen.




Bild 3:

Stützen Sie die Hand mit der COMOD®-Flasche wie dargestellt auf der freien Hand ab.




Bild 4:

Legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie mit der freien Hand das Unterlid leicht vom Auge ab und drücken Sie schnell und kräftig in der Mitte auf den Flaschenboden. Dadurch wird der Mechanismus zur Entnahme eines Tropfens betätigt. Aufgrund der besonderen Ventiltechnik des COMOD®-Systems ist die Grösse und Geschwindigkeit des Tropfens auch bei sehr kräftigem Druck auf den Flaschenboden immer gleich. Schliessen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmässig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann.




Bild 5:

Nach Gebrauch die Tropferspitze sofort sorgfältig mit der Kappe verschliessen. Bitte achten Sie darauf, dass die Tropferspitze trocken ist. Vermeiden Sie beim Tropfen einen Kontakt der Tropferspitze mit Auge oder Gesichtshaut.

Der Flasche können 10 ml Lösung entnommen werden; dies entspricht etwa 300 Tropfen. Aus produktions-technischen Gründen bleibt stets ein kleiner Flüssigkeitsrest in der Flasche zurück. Die Dauer der Anwendung von **HYLO®-DUAL** ist nicht beschränkt. Mit dem Inhalt einer Flasche **HYLO®-DUAL** sollte immer dieselbe Person behandelt werden.

Welche weiteren Hinweise zur Anwendung sind zu beachten?

Für den Fall einer zusätzlichen anderen medikamentösen Behandlung mit Augentropfen sollte ein Anwendungsabstand von mindestens 30 Minuten eingehalten werden. **HYLO®-DUAL** sollte dann immer zuletzt verabreicht werden. Augensalben sollten in jedem Fall nach **HYLO®-DUAL** in den Bindehautsack eingestrichen werden.

Aufgrund ihrer Konservierungsmittelfreiheit ist **HYLO®-DUAL** Augentropfen auch bei langdauernder Anwendung besonders gut verträglich. In sehr seltenen Einzelfällen wurde von Überempfindlichkeitsreaktionen (Brennen, Tränenfluss) berichtet, die nach Absetzen von **HYLO®-DUAL** direkt abklagen. **HYLO®-DUAL** kann während des Tragens von Kontaktlinsen angewandt werden. Wir empfehlen, nach dem Einsetzen von Kontaktlinsen mit der Anwendung der Augentropfen etwa 30 Minuten zu warten, um mögliche Unverträglichkeitsreaktionen zu vermeiden, die aufgrund von Wechselwirkungen zwischen Kontaktlinsenpflegemitteln und **HYLO®-DUAL** möglich sind.

Über eine Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine Erkenntnisse vor. Fragen Sie vor der Anwendung von **HYLO®-DUAL** Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie schwanger sind, schwanger sein könnten oder stillen.

Wie oft und wie lange sollte man HYLO®-DUAL anwenden?

HYLO®-DUAL sollte individuell gemäss der Empfehlung Ihres Augenarztes dosiert werden. Im Allgemeinen tropfen Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren 3 mal täglich 1 Tropfen **HYLO®-DUAL** in den Bindehautsack jeden Auges. Sollten Sie **HYLO®-DUAL** häufiger (z.B. mehr als 10 mal täglich) und bei stärkeren Beschwerden anwenden, lassen Sie Ihre Augen regelmässig vom Augenarzt untersuchen. **HYLO®-DUAL** ist für eine Daueranwendung geeignet, allerdings sollten Sie - wie bei allen Erkrankungen - bei länger anhaltenden Beschwerden (z.B. länger als zwei Wochen) einen Augenarzt um Rat fragen.

Wann sollte man HYLO®-DUAL nicht anwenden?

HYLO®-DUAL sollte nicht bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile und nicht bei Kindern unter 6 Jahren angewendet werden.

Welche Hinweise zur Aufbewahrung von HYLO®-DUAL sind zu beachten?

Bei Raumtemperatur lagern.

Nach Anbruch einer Flasche ist **HYLO®-DUAL** 6 Monate verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums (☞) nicht mehr anwenden.

Folgende Packungsgrössen sind erhältlich: 10 ml Augentropfen

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information:

März 2016

Ihre Meinung zu unserem Produkt ist uns wichtig!
Wir freuen uns, per Post, Fax 0041 71 454 70 45 oder via info@pharmamedica.ch von Ihnen zu hören.

Hersteller (M):

URSAPHARM, Industriestrasse, 66129 Saarbrücken, Deutschland
Tel.: 0049 (0) 6805 9292-0, Fax: 0049 (0) 6805 9292-88,
email: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

Vertrieb:

Pharma Medica AG, Frohheimstr. 2, CH-9325 Roggwil TG
Tel. 0041 71 454 70 44, Fax: 0041 71 454 70 45,
info@pharmamedica.ch, www.pharmamedica.ch

Mode d'emploi

Veillez lire attentivement ces informations, elles vous aideront à utiliser correctement **HYLO®-DUAL**.

HYLO®-DUAL

Hyaluronate de sodium et ectoïne

Humidifie les yeux secs, stabilise le film lacrymal et réduit ainsi les symptômes allergiques et inflammatoires tels que démangeaisons et sensations de brûlure

Solution stérile sans phosphates et sans agent conservateur

Qu'est-ce que HYLO®-DUAL?

HYLO®-DUAL est une solution stérile sans conservateur contenant 0,5 mg/ml d'hyaluronate de sodium, 20 mg/ml d'ectoïne, un tampon de borate et de l'eau.

À qui sert HYLO®-DUAL?

HYLO®-DUAL humidifie la cornée et la conjonctive, et protège contre une évaporation lacrymale excessive. Cette stabilisation du film lacrymal soulage l'irritation des yeux lorsque celle-ci est liée à des symptômes inflammatoires ou causée par une allergie. Elle calme démangeaisons et sensations de brûlure des yeux.


Quand faut-il utiliser HYLO®-DUAL?

Les sensations de brûlure ou de sable dans les yeux, les démangeaisons, le larmoiement et la sécheresse oculaire sont les symptômes d'un œil irrité. Ils indiquent souvent que l'œil n'est pas suffisamment humide. Les allergies, c'est-à-dire l'hypersensibilité à certaines substances telles que le pollen, les poils d'animaux ou la poussière, constituent une autre cause possible à ces symptômes. Comme une allergie s'accompagne des mêmes troubles que la sécheresse oculaire, il est difficile de déterminer si l'irritation des yeux est causée par l'une ou par l'autre. Grâce à son double principe actif à base d'hyaluronate de sodium et d'ectoïne, **HYLO®-DUAL** est particulièrement indiqué lorsque la cause de l'irritation reste indéterminée.

HYLO®-DUAL contient l'hyaluronate de sodium, une substance naturelle, que l'on retrouve dans l'œil mais aussi ailleurs dans le corps. Il a pour propriété physique spécifique de former à la surface de l'œil un film d'humidité homogène et stable qui dure longtemps. L'ectoïne est extraite de micro-organismes vivant dans des milieux inhospitaliers comme les lacs salés. C'est pour se protéger des conditions environnementales extrêmes qui y règnent qu'ils produisent cette substance naturelle, dont les propriétés spéciales sont mises à profit dans **HYLO®-DUAL**. En effet, l'ectoïne augmente la capacité des cellules de la surface oculaire à retenir l'humidité et forme ainsi sur la conjonctive une barrière physiologique contre les allergènes. Elle stabilise en outre la partie lipolytique du film lacrymal, qui protège contre une évaporation lacrymale excessive. Ensemble, l'hyaluronate de sodium et l'ectoïne recouvrent l'œil d'un film hautement hydratant qui dure et le protège de l'évaporation lacrymale. Ainsi, ils atténuent aussi bien l'irritation oculaire liée à l'environnement, source de symptômes inflammatoires, que les symptômes typiques de démangeaisons et de brûlure des yeux causés par les allergies.


Comment utiliser HYLO®-DUAL?

N'utilisez **HYLO®-DUAL** que lorsque l'emballage extérieur est scellé de façon intacte avant la première utilisation.




Étape 1:

Retirer le capuchon avant chaque utilisation. Pour ce faire, maintenez le capuchon vers le haut avec une main et retirez le flacon dans un mouvement de rotation avec l'autre main. Avant la première application d'**HYLO®-DUAL**, maintenir le flacon à l'envers avec l'embout compte-goutte en position verticale et appuyer plusieurs fois sur le fond du flacon jusqu'à ce que la première goutte sorte à l'embout du flacon. Le flacon est ainsi prêt à l'emploi pour les applications suivantes.



Étape 2:

Maintenir le flacon avec l'embout compte-goutte vers le bas, en plaçant le pouce sur l'épaule du flacon et les autres doigts sur le fond du flacon.



Étape 3:

Comme indiqué, soutenir de la main libre la main tenant le flacon COMOD®.

URSAPHARM

CE 0197


STERILE A

URSAPHARM



**Étape 4 :**

Incliner la tête légèrement en arrière ; de la main libre, éloigner délicatement la paupière inférieure de l'œil et appuyer rapidement et vigoureusement au centre du fond du flacon. Ceci actionne le mécanisme de délivrance d'une goutte. Grâce à la technique à valve particulière du système COMOD®, la taille et la vitesse des gouttes sont toujours identiques, même en cas de pression très forte exercée sur le fond du flacon. Fermer lentement l'œil, afin d'assurer une répartition régulière du liquide à la surface de l'œil.

**Étape 5 :**

Après utilisation, replacer directement et soigneusement le capuchon sur l'embout compte-gouttes. S'assurer que l'embout compte-gouttes est bien sec. Éviter tout contact entre l'embout compte-gouttes et l'œil ou la peau du visage lors de l'instillation.

Le flacon peut fournir 10 ml de solution, ce qui correspond à environ 300 gouttes. Pour des raisons techniques, le flacon ne peut pas être complètement vidé; il reste toujours un peu de solution dans le fond.

La durée de traitement avec **HYLO®-DUAL** n'est pas limitée.

Le contenu d'un flacon de **HYLO®-DUAL** est réservé au traitement d'une seule et même personne.

Quelles autres indications faut-il observer lors de l'utilisation?

En cas de traitements médicamenteux concomitants sous forme de collyres, il convient de respecter un intervalle d'au moins 30 minutes entre les différentes administrations. **HYLO®-DUAL** doit toujours être administré en dernier. Les pomades ophtalmiques doivent dans tous les cas être appliquées dans le sac conjonctival après **HYLO®-DUAL**.

Dun fait que le collyre **HYLO®-DUAL** ne contient pas d'agents conservateurs, son utilisation est particulièrement bien tolérée même sur une période longue. Des réactions d'hypersensibilité ont été observées (brûlures, larmolement) dans de très rares cas particuliers, mais ont disparu aussitôt après l'arrêt de l'utilisation de **HYLO®-DUAL**.

HYLO®-DUAL peut être administré même en cas de port de lentilles de contact. Afin d'éviter d'éventuelles réactions d'intolérance liées aux interactions entre les produits d'entretien pour lentilles et **HYLO®-DUAL**, nous recommandons d'attendre environ 30 minutes entre la mise en place des lentilles de contact et l'administration du collyre.

Il n'existe pas de données sur l'utilisation chez la femme enceinte ou pendant l'allaitement. Si vous êtes enceinte, pensez l'être ou allaitez, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser **HYLO®-DUAL**.

À quelle fréquence et pendant combien de temps HYLO®-DUAL peut-il être utilisé?

La fréquence et la durée d'utilisation de **HYLO®-DUAL** sont définies par votre ophtalmologue en fonction de vos besoins particuliers. En général, 1 goutte de **HYLO®-DUAL** est instillée 3 fois par jour dans le sac conjonctival de chaque œil chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans. Si vous utilisez **HYLO®-DUAL** plus fréquemment (p. ex. plus de 10 fois par jour) et en cas de douleurs plus fortes, consultez régulièrement votre ophtalmologue. **HYLO®-DUAL** convient pour une utilisation sur une longue durée ; en cas de douleurs persistantes, comme pour toutes les affections, veuillez toutefois vous adresser à un ophtalmologue.

Quand ne devrait-on pas utiliser HYLO®-DUAL?

HYLO®-DUAL ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants et chez les enfants de moins de 6 ans.

Quelles précautions faut-il observer pour conserver HYLO®-DUAL?

À conserver à température ambiante.

HYLO®-DUAL se conserve 6 mois après ouverture.

Ne pas utiliser le collyre après la date de péremption (M)

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Les emballages suivants sont disponibles:

Collyre 10 ml

Dernière mise à jour:

Mars 2016

Fabricant (M):

URSAPHARM, Industriestrasse, 66129 Saarbrücken, Allemagne

Tel.: 0049 (0) 6805 9292-0, Fax: 0049 (0) 6805 9292-88

email: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

Distributeur:

Pharma Medica AG, Frohheimstr. 2, CH-9325 Roggwil TG

Tel. 0041 71 454 70 44, Fax: 0041 71 454 70 45

info@pharmamedica.ch, www.pharmamedica.ch

**Istruzioni per l'uso**

Si prega di leggere attentamente queste informazioni perché vi saranno utili per utilizzare correttamente **HYLO®-DUAL**

HYLO®-DUAL

ialuronato di sodio e ectoina

Idrata gli occhi secchi, stabilizza il film lacrimale e riduce i sintomi infiammatori o allergici come prurito o bruciore**Soluzione sterile priva di fosfati e senza conservanti****Cos'è HYLO®-DUAL?**

HYLO®-DUAL è una soluzione sterile senza conservanti, contenente 0,5 mg/ml di ialuronato di sodio, 20 mg/ml di ectoina, un tampone borato e acqua.

Perché usare HYLO®-DUAL?

HYLO®-DUAL idrata la cornea e la congiuntiva e protegge dall'eccessiva evaporazione delle lacrime. La stabilizzazione del film lacrimale mitiga le irritazioni degli occhi collegate a sintomi infiammatori o causate dalle allergie e fa scomparire la sensazione di bruciore e prurito degli occhi.

Quando utilizzare HYLO®-DUAL?


Il bruciore e la sensazione di prurito agli occhi, la lacrimazione, la sensazione di avere sabbia negli occhi o gli occhi asciutti sono sintomi di un occhio irritato. Spesso questi segni indicano che l'occhio non è sufficientemente idratato. Un'altra delle cause potrebbe essere l'ipersensibilità a determinate sostanze (come ad es. polline, peli di animali o polvere domestica), ovvero le cosiddette allergie. Poiché le allergie si presentano con gli stessi disturbi, è difficile distinguere tra un occhio secco e un occhio irritato a causa di un'allergia. In questi casi **HYLO®-DUAL** grazie al suo doppio principio di ialuronato di sodio e ectoina offre molti vantaggi. Lo ialuronato di sodio è una sostanza naturale che si trova nell'occhio ed in altre parti del corpo. Essa ha la caratteristica fisica unica di formare una pellicola d'umidità uniforme, stabile e particolarmente aderente sulla superficie dell'occhio, che non viene eliminata rapidamente.

L'ectoina è una sostanza naturale che viene estratta da microrganismi che vivono in ambienti estremi (come ad es. i laghi salati). Per proteggersi dai fattori ambientali estremi questi microrganismi producono l'ectoina, le cui proprietà speciali sono utilizzate in **HYLO®-DUAL**. L'ectoina aumenta l'aderenza dell'acqua alle cellule della superficie oculare, creando così una barriera fisiologica per gli allergeni sulla congiuntiva. Allo stesso tempo, l'ectoina stabilizza la porzione liposolubile del film lacrimale, proteggendo da un'eccessiva evaporazione delle lacrime.

Grazie all'interazione tra lo ialuronato di sodio e l'ectoina si crea sull'occhio una densa pellicola d'umidità ad alta aderenza, che lo protegge dall'evaporazione delle lacrime. Questo contrasta le irritazioni che portano all'insorgere dei sintomi infiammatori e allevia i sintomi tipici delle reazioni allergiche, quali ad esempio bruciore e sensazione di prurito.

Come si usa HYLO®-DUAL?


Utilizzare **HYLO®-DUAL** soltanto se la sigillatura della scatola pieghevole era intatta prima della prima applicazione.

**Figura 1:**

Togliere il tappo di protezione prima di ogni utilizzo. Con il flacone in posizione verticale, tenere fermo il tappo facendo ruotare e tirando verso il basso il flacone con l'altra mano. Prima di procedere al primo utilizzo di **HYLO®-DUAL** si prega di tenere il flacone in posizione verticale con l'ugello rivolto verso il basso e dare dei colpetti sul fondo del flacone fino alla fuoriuscita della prima goccia all'estremità del contagocce. A questo punto il flacone è pronto per essere utilizzato.

**Figura 2:**


Mantenere il flacone con la punta dell'ugello rivolta verso il basso, tenendo il pollice appoggiato sulla parte superiore del flacone e le altre dita appoggiate alla base del flacone.

**Figura 3:**

Appoggiare la mano che regge il flacone COMOD® contro la mano libera come illustrato nella figura.

**Figura 4:**

Reclinare leggermente la testa all'indietro, con la mano libera tirare delicatamente la palpebra inferiore verso il basso e premere rapidamente e con energia la parte centrale alla base del flacone. In questo modo viene attivato il meccanismo che permette la fuoriuscita di una goccia. Grazie alla speciale tecnica a valvola del sistema COMOD®, le dimensioni e la velocità della goccia sono sempre le stesse e ciò indipendentemente dalla pressione esercitata sul fondo del flacone. Chiudere lentamente gli occhi per permettere al liquido di distribuirsi uniformemente sulla superficie oculare.

**Figura 5:**

Dopo l'uso riporre subito con cura il tappo sull'ugello. Assicurarsi che la punta dell'ugello sia asciutta. Durante l'applicazione evitare accuratamente che l'ugello entri in contatto con l'occhio o la pelle del viso.

Dal flacone si possono prelevare 10 ml di soluzione, corrispondenti a circa 300 gocce. Per motivi tecnici, all'interno del flacone resta sempre un piccolo residuo di liquido.

L'utilizzo di **HYLO®-DUAL** non ha una durata illimitata.

Con il contenuto di un flacone di **HYLO®-DUAL** deve essere trattata sempre la stessa persona.

Quali altri precauzioni bisogna osservare al momento dell'utilizzo?

In caso di altre terapie mediche sotto forma di collirio adottate contemporaneamente occorre rispettare un intervallo di tempo minimo di 30 minuti tra un'applicazione e l'altra. **HYLO®-DUAL** deve essere sempre somministrato per ultimo. Le pomate oftalmiche devono essere applicate nel sacco congiuntivale sempre successivamente all'uso di **HYLO®-DUAL**. Poiché le gocce oculari **HYLO®-DUAL** non contengono conservanti, il prodotto è particolarmente ben tollerato anche in caso di un trattamento di lunga durata. Sono state osservate in rarissimi casi reazioni di ipersensibilità (bruciore, lacrimazione), che tuttavia scompaiono immediatamente interrompendo la somministrazione di **HYLO®-DUAL**.

HYLO®-DUAL può essere utilizzato anche quando si indossano lenti a contatto. Dopo l'utilizzo di lenti a contatto in combinazione con l'applicazione di gocce oculari raccomandiamo di attendere 30 minuti circa al fine di evitare possibili reazioni di intolleranza che potrebbero essere causate da interazioni tra i detergenti per lenti a contatto e **HYLO®-DUAL**. Attualmente non sono disponibili informazioni relative all'uso del prodotto durante gravidanza e allattamento. Se Lei è incinta, sta allattando o potrebbe essere incinta consulti il Suo medico o il farmacista prima di utilizzare **HYLO®-DUAL**.

Con quale frequenza e per quanto tempo si può utilizzare HYLO®-DUAL?

HYLO®-DUAL deve essere somministrato secondo le raccomandazioni del Suo oftalmologo. In generale per gli adulti e i bambini a partire dai 6 anni di età s'instilla 1 goccia di **HYLO®-DUAL** 3 volte al giorno nel sacco congiuntivale di ciascun occhio. Se si dovesse utilizzare **HYLO®-DUAL** più frequentemente (ad es. più di 10 volte al giorno) e in caso di disturbi più gravi, si consiglia vivamente di rivolgersi ad un oftalmologo per farsi esaminare gli occhi regolarmente. **HYLO®-DUAL** è adatto per un utilizzo di lunga durata; tuttavia, come nel caso di qualsiasi altra affezione, se i disturbi persistono (ad es. più di due settimane) si consiglia vivamente di consultare un oftalmologo.

Quando è sconsigliato l'uso di HYLO®-DUAL?

HYLO®-DUAL non si deve utilizzare in caso di ipersensibilità ad uno dei suoi componenti e nei bambini sotto i sei anni.

Come va conservato HYLO®-DUAL

Conservare a temperatura ambiente.

Dopo l'apertura del flacone, **HYLO®-DUAL** si può utilizzare per 6 mesi.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza (M)

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Il prodotto è disponibile nelle confezioni seguenti:

Gocce oculari 10 ml

Ultimo aggiornamento:

Marzo 2016

La vostra opinione sui nostri prodotti è importante per noi! Vi preghiamo di contattarci per posta, fax 0041 71 454 70 45 oppure all'indirizzo info@pharmamedica.ch.

Produttore (M):

URSAPHARM, Industriestrasse, 66129 Saarbrücken, Germania

Tel.: 0049 (0) 6805 9292-0, Fax: 0049 (0) 6805 9292-88,

email: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

Distribuito da:

Pharma Medica AG, Frohheimstr. 2, CH-9325 Roggwil TG

Tel. 0041 71 454 70 44, Fax: 0041 71 454 70 45

info@pharmamedica.ch, www.pharmamedica.ch

